

VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2023

Población a la cual se encuentra dirigida la vacunación antigripal.

- Personal de salud
- Personas gestantes/ puérperas
- Niños y niñas de **6 a 24 meses** de edad
- **Personas entre los 2 y 64 años** que tengan factores de riesgo
- Personas de **65 años y mayores**
- Personal estratégico

Presentación de vacunas antigripales 2023

- Vacuna (**Viraf lu®**) y Vacuna (**INFLUVAC®**): **0,5 ml**. (Se presenta en forma de **líquido transparente**).
- Vacuna **Viraf lu®** **Pediátrica**: **0,25 ml**. (Se presenta en forma de **líquido transparente**).
- Vacuna (**Fluxvir®**): **0,5 ml**. (**Se presenta como una suspensión blanquecina**).

Dosificación.:

-Para las Vacunas **Viraf lu®** e **INFLUVAC®**:

- Personas entre los **6 meses y 35 meses de edad**: **0,25 ml**
- Personas de **3 años de edad y más**: **0,5 ml**

-Para la Vacuna **Viraf lu®** **Pediátrica**:

- Personas entre **6 y 35 meses de edad**: **0,25 ml**

- Vacuna **Fluxvir®**:

- Personas de **65 años o más**: **0,5 ml**

•
ACLARACION IMPORTANTE.(!).:

- 1) La **VACUNACION** de aquellos niños que **NO estén en el grupo de 6 a 24 meses** se hará **Sólo con Orden Pediátrica (!)**, que deberá ser retenida y archivada en el consultorio anotando en la misma día y hora de vacunación del niño
- 2) Los **Niños de 6 á 24 meses deben recibir 2 dosis de 0,25ml** separadas por un mes (4 semanas al menos), salvo **que en campaña anterior ya hallan recibido 2 dosis**, en cuyo caso corresponderá aplicarles sólo una (1) dosis de 0.25ml


Vía de administración y sitio de administración

- Vacuna trivalente Virafly / INFLUVAC: Intramuscular o subcutánea profunda.
- **Vacuna Fluxvir: intramuscular únicamente.** Deben ser colocadas en la parte superior del brazo (musculo deltoides).
- **Virafly Pediátrica: Intramuscular o subcutánea profunda**

En menores de un año.:

se administra en la **región antero lateral(externa) del muslo.**

- Lactantes y niños <12 meses



**INYECCION INTRAMUSCULAR
CARA ANTEROLATERAL DEL
MUSLO (VASTO EXTERNO).**

En caso de no disponer de dosis pediátrica, **se puede utilizar media dosis de Vacuna trivalente TIV (Virafly o INFLUVAC) de personas adultas (0,5 ml)** para su aplicación pediátrica. Para esto, **deseche la mitad del volumen que contiene la jeringa** (hasta la marca indicada en el cuerpo) antes de la inyección, para dar la dosis correcta y asegurarse que no se utilice el resto.

INSTRUCTIVO PARA LA VACUNACIÓN ANTIGRI PAL 2023

Antes de la vacunación:

- Realizar un breve cuestionario prevacunación con la finalidad de detectar contraindicaciones y otras situaciones especiales.

Cuestionario prevacunación

	Preguntas	Si	No
1	¿Se siente enfermo el día de hoy?		
2	¿Es alérgico a algún medicamento, alimento, vacuna?		
3	¿Es alérgico al huevo o al pollo?		
4	¿Ha tenido antes una reacción alérgica a alguna vacuna?		
5	¿Ha recibido la vacuna antigripal años anteriores?		
6	¿Presento alguna complicación con la vacunación antigripal previamente?		

Considerando las respuestas proporcionadas por los pacientes, se debe evaluar el riesgo beneficio de la aplicación de la vacuna antigripal.

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS | NO VACUNAR

- **Antecedente de reacción anafiláctica en una vacunación previa contra la influenza.**
- Antecedentes de **Síndrome de Guillain-Barre**(parálisis ascendente progresiva) **ocurrido dentro de las seis semanas de haber recibido una dosis de vacuna antigripal** en el caso de haberse descartado otras causas (el antecedente de haber tenido el síndrome por otras causas no es contraindicación para la vacunación antigripal).

PRECAUCIONES | EVALUAR RIESGO –BENEFICIO

- Hipersensibilidad a los principios activos, a alguno de los excipientes y a los residuos (por ejemplo, huevo o pollo).
- Ante una Enfermedad aguda grave con fiebre: esperar y citar para vacunara una vez restablecido del cuadro (una semana aproximadamente).
- Intolerancia al huevo o antecedente de reacción alérgica no anafiláctica al huevo.

VACUNACION

Material y equipo necesario:

- **Descartador de corto punzantes color rojo** (solo para el descarte de las vacunas ya utilizadas).
- **Cesto de residuos con bolsa roja para el desecho de los materiales biológicos.** Y un cesto con bolsa negra para el descarte de cartones y envoltorios.
- Alcohol, algodón y cinta adhesiva hipoalergénica.
- Botiquín de primeros auxilios (caja de emergencias) ante **Reacción Anafiláctica.** (2 ó más de siguientes síntomas-signos: dificultad respiratoria, tos, bronco espasmo, caída de presión arterial, desmayo, síncope, erupción cutánea- urticaria, edema de labios, párpados o lengua, dolor abdominal, vómitos). >
- **No demorar el uso de ADRENALINA 0,3 á 0,4 ml =0,3 á 0,4 mg IM > en muslo o músc. deltoides** (la ampolla viene de 1ml = 1mg, x lo que ante esta emergencia se le aplica al paciente aprox 1/3 o un poquito más de la ampolla x vía IM).

Procedimiento para vacunar

1. **¡Usar BARBIJO al estar frente al paciente!**
2. Realizar una **correcta higiene de manos** con agua y jabón o alcohol en gel (también al finalizar la vacunación).
3. **Retirar la vacuna antigripal de la heladera 5-10 minutos antes de su administración.** > debe llegar a temperatura ambiente (!)
4. **Se debe agitar antes de usar.**
5. Antes de su administración retirar **el troquel identificador** de la misma para ser **pegado** en el registro.
6. Comprobar la fecha de caducidad de la vacuna, así como el aspecto y color de la misma: agitar levemente para verificar que no haya partículas en suspensión. Si se observan partículas o coloración en las jeringas, **no se debe utilizar.** Rotular y dejar a la temperatura correspondiente e informar a su superior.
7. Elegir una zona de piel intacta y sin lesiones. No aplicar en lugares donde exista inflamación, dolor, lesiones, anestesia ni vasos sanguíneos visibles.
8. Limpiar la zona con algodón embebido en suero fisiológico o alcohol y dejar secar.
9. Al terminar la inyección, retirar rápidamente la aguja y presionar ligeramente la zona de la punción con un algodón. **No se debe realizar masaje sobre la zona.**

10. Cubrir la zona de punción con una bolita de algodón y una cinta adhesiva; puede retirarse pocos minutos después.
11. ¡¡**NO REENCAPUCHAR LAS JERINGAS YA UTILIZADAS!!**
12. Recomendar que permanezca, al menos, 15 minutos en observación en la sala de espera, para detectar posibles reacciones adversas inmediatas.

Después de la vacunación

Desechar todos los materiales usados de forma segura, siguiendo los protocolos establecidos:

- La jeringa-aguja, de forma inmediata en el descartador de residuos punzo-cortantes y biopeligrosos.
- El resto de materiales (algodón, cinta, capuchón de la jeringa, etc.), en el cesto de residuos con bolsa **roja**.

Registrar la vacunación en el sistema de registro proporcionado, detallando los **datos del paciente**, así como también el **número de lote** y vencimiento de la vacuna aplicada. Para garantizar un correcto registro **solicitar el DNI** u otro elemento identificatorio.

IMPORTANTE (!)

En el Caso de Vacunaciones Ambulatorias.: Bancos/ Delegaciones, Domicilios.:

- Realizar la vacunación siempre que se cuente con los descartadores de agujas rojos y bolsas rojas para desechos biológico
- **POR FAVOR: NO IMPROVISAR DESCARTADORES CON BIDONES, LATAS O CAJAS**, ese proceder -que se ha constatado, se realiza frecuentemente-, entraña un **grave e inadmisibles riesgo** para quienes deban transportar y/o desechar posteriormente esos elementos de **USO NO PERMITIDO** y su contenido de **Riesgo Biológico**).